

Lombardia: Ecco gli ospedali “al top” dove curarsi

Le indicazioni e le graduatorie offerte dal portale “Dove e come mi curo” per la Regione.

Da oggi per diversi importanti problemi di salute i cittadini potranno trovare online le strutture migliori dove curarsi, scegliendole sia per vicinanza geografica, sia in base a punteggi elaborati con criteri di valutazione oggettivi e controllati. Da oggi è online, infatti, il portale “Dove e come mi curo”, www.doveecomemicuro.it, che permette di fare rapidamente una ricerca delle strutture sanitarie migliori della tua Regione in base al proprio problema di salute. Tu chiedi e il sito risponde in modo semplice e immediato, “accendendo” un semaforo: disco verde, se la struttura è “promossa” – ovvero se per un certo problema di salute è allineata agli standard raccomandati a livello nazionale e internazionale e se ha una performance migliore della media italiana; disco rosso se invece la struttura non raggiunge questi standard e la sua performance nella gestione di una certa patologia è globalmente inferiore alla performance media nazionale.

Di seguito le graduatorie estratte interrogando il portale “Dove e come mi curo”, per la Regione Lombardia, relativamente a numerose aree della salute: dal parto ai tumori, dall’infarto all’ictus e poi le fratture, solo per citarne alcune.

Sono riportate diverse tipologie di strutture, divise per ospedali a rilevanza nazionale (Aziende Ospedaliere, IRCCS, Policlinici universitari), presidi ospedalieri (presidi delle Asl) e Case di Cura (Case di Cura Private e accreditate SSN). Per ciascuna area di salute sono stati selezionati uno o più indicatori di performance. Le graduatorie includono solo le strutture “al top” per tutti gli indicatori considerati, ovvero solo le strutture che hanno tutti semafori verdi per ogni aspetto inerente alla gestione di un certo problema.

Salute della mamma e del bambino

Parto

Per valutare la qualità dell’assistenza per la salute di mamma e bambino il portale “Dove e come mi curo” considera due importanti indicatori: la proporzione dei tagli cesarei (che è un criterio di appropriatezza nella gestione del parto) e il numero dei parti effettuati annualmente (volume - che, quando è elevato, è garanzia di sicurezza). Il valore medio nazionale per la proporzione dei parti con taglio cesareo è di 26,27%. E per quanto riguarda il volume dei parti l’Accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2010 fissa in almeno 1000 nascite/anno lo standard cui tendere.

Ecco per la Regione Lombardia la mappa dei semafori verdi per entrambi gli indicatori:

Ospedali a rilevanza nazionale:

Strutture	Indicatore	Valore indicatore	Media nazionale
Ospedale Vittorio Emanuele III - Carate Brianza	Proporzione di parti con taglio cesareo primario	4,68%	26,27%
	Volume di parti	2030	1000 parti/anno
Ospedale di Circolo A. Manzoni - Lecco	Proporzione di parti con taglio cesareo primario	8,06%	26,27%
	Volume di parti	1618	1000 parti/anno
Ospedale di Magenta	Proporzione di parti con taglio cesareo primario	8,12%	26,27%
	Volume di parti	1654	1000 parti/anno
Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi	Proporzione di parti con taglio cesareo primario	8,15%	26,27%
	Volume di parti	3493	1000 parti/anno
Ospedale Civile – Vimercate	Proporzione di parti con taglio cesareo primario	10,28%	26,27%
	Volume di parti	1680	1000 parti/anno
Ospedale S. Antonio Abate - Gallarate	Proporzione di parti con taglio cesareo primario	10,75%	26,27%
	Volume di parti	1216	1000 parti/anno
Azienda ospedaliera S. Paolo - Milano	Proporzione di parti con taglio cesareo primario	11,12%	26,27%
	Volume di parti	1878	1000 parti/anno
Ospedale Pesenti Fenaroli - Alzano Lombardo	Proporzione di parti con taglio cesareo primario	13,2%	26,27%
	Volume di parti	1198	1000 parti/anno
Ospedale del Ponte – Varese	Proporzione di parti con taglio cesareo primario	14,26%	26,27%
	Volume di parti	3271	1000 parti/anno
Ospedale S. Anna –	Proporzione di parti	14,26%	26,27%

Como	con taglio cesareo primario		
	Volume di parti	1891	1000 parti/anno
Ospedale di Legnano – Legnano	Proporzione di parti con taglio cesareo primario	14,83%	26,27%
	Volume di parti	1022	1000 parti/anno
Ospedale Riuniti – Bergamo	Proporzione di parti con taglio cesareo primario	14,86%	26,27%
	Volume di parti	3807	1000 parti/anno
Ospedale di Circolo- Busto Arsizio	Proporzione di parti con taglio cesareo primario	14,95%	26,27%
	Volume di parti	1425	1000 parti/anno
Ospedale di Desenzano - Desenzano del Garda	Proporzione di parti con taglio cesareo primario	17,61%	26,27%
	Volume di parti	1300	1000 parti/anno
Istituti Ospitalieri – Cremona	Proporzione di parti con taglio cesareo primario	18,41%	26,27%
	Volume di parti	1297	1000 parti/anno
Ospedale Bolognini – Seriate	Proporzione di parti con taglio cesareo primario	18,71%	26,27%
	Volume di parti	1701	1000 parti/anno
Ospedale di Treviglio e Caravaggio - Treviglio	Proporzione di parti con taglio cesareo primario	19,43%	26,27%
	Volume di parti	1495	1000 parti/anno
Azienda Ospedaliera Spedali Civili - Brescia	Proporzione di parti con taglio cesareo primario	20,24%	26,27%
	Volume di parti	3667	1000 parti/anno

Presidi ospedalieri: nessuno

Case di Cura:

Strutture	Indicatore	Valore indicatore	Media nazionale
-----------	------------	-------------------	-----------------

Casa di cura per il bambino e la sua mamma - Monza	Proporzione di parti con taglio cesareo primario	7,6%	26,27%
	Volume di parti	3060	1000 parti/anno
Casa di cura Poliambulanza - Brescia	Proporzione di parti con taglio cesareo primario	20,05%	26,27%
	Volume di parti	2627	1000 parti/anno

Tumori

Tumori del colon

Sul fronte dei tumori del colon uno degli indicatori considerati dal portale è la mortalità a trenta giorni dall'intervento di rimozione della neoplasia. La media nazionale per questo indicatore è 4,37%.

Ecco per la Regione Lombardia la mappa dei semafori verdi per l'indicatore:

Ospedali a rilevanza nazionale:

Strutture	Indicatore	Valore indicatore	Media nazionale
Ospedale di Magenta	Intervento per tumore maligno del colon: mortalità a trenta giorni	1,13%	4,37%
Ospedale Generale Provinciale - Saronno	Intervento per tumore maligno del colon: mortalità a trenta giorni	1,23%	4,37%
Ospedale Sacra Famiglia F.B.F. - Erba	Intervento per tumore maligno del colon: mortalità a trenta giorni	1,30%	4,37%
Ospedale Maggiore Policlinico	Intervento per tumore maligno del colon: mortalità a trenta giorni	1,37%	4,37%

Ospedale di Desenzano - Desenzano del Garda	Intervento per tumore maligno del colon: mortalità a trenta giorni	1,44%	4,37%
Ospedale di Circolo - Busto Arsizio	Intervento per tumore maligno del colon: mortalità a trenta giorni	1,52%	4,37%
Istituto Multimedica Holding - Sesto San Giovanni	Intervento per tumore maligno del colon: mortalità a trenta giorni	1,57%	4,37%
Istituto di Ricerca S. Raffaele - Milano	Intervento per tumore maligno del colon: mortalità a trenta giorni	1,83%	4,37%
Ospedale S.Gerardo – Monza	Intervento per tumore maligno del colon: mortalità a trenta giorni	1,86%	4,37%
Azienda Ospedaliera Spedali Civili - Brescia	Intervento per tumore maligno del colon: mortalità a trenta giorni	1,88%	4,37%
Ospedale Niguarda - Ca'Granda - Milano	Intervento per tumore maligno del colon: mortalità a trenta giorni	1,95%	4,37%
Ospedale di Circolo - Rho	Intervento per tumore maligno del colon: mortalità a trenta giorni	2,05%	4,37%
Istituto Europeo di Oncologia - Milano	Intervento per tumore maligno del colon: mortalità a trenta giorni	2,11%	4,37%
Istituti Ospitalieri - Cremona	Intervento per tumore maligno del colon: mortalità a trenta giorni	2,14%	4,37%
Ospedale Civile - Vimercate	Intervento per tumore maligno del colon:	2,34%	4,37%

	mortalità a trenta giorni		
Ospedale S.L. Mandic - Merate	Intervento per tumore maligno del colon: mortalità a trenta giorni	2,39%	4,37%
Istituto Clinico Humanitas - Rozzano	Intervento per tumore maligno del colon: mortalità a trenta giorni	2,41%	4,37%
Ospedale di Legnano - Legnano	Intervento per tumore maligno del colon: mortalità a trenta giorni	2,59%	4,37%
Ospedale di Circolo - Desio	Intervento per tumore maligno del colon: mortalità a trenta giorni	2,6%	4,37%
Ospedale Policlinico S. Matteo - Pavia	Intervento per tumore maligno del colon: mortalità a trenta giorni	2,65%	4,37%
IRCCS Policlinico S. Donato - San Donato Milanese	Intervento per tumore maligno del colon: mortalità a trenta giorni	2,90%	4,37%

Presidi ospedalieri:

Strutture	Indicatore	Valore indicatore	Media nazionale
Ospedale Sacra Famiglia F.B.F. - Erba	Intervento per tumore maligno del colon: mortalità a trenta giorni	1,3%	4,37%
Ospedale di Manerbio - Manerbio	Intervento per tumore maligno del colon: mortalità a trenta giorni	2,49%	4,37%

Case di cura:

Strutture	Indicatore	Valore indicatore	Media nazionale
Casa di cura Poliambulanza - Brescia	Intervento per tumore maligno del colon: mortalità a trenta giorni	1,65%	4,37%
Casa di cura Mater Domini - Castellanza	Intervento per tumore maligno del colon: mortalità a trenta giorni	1,96%	4,37%
Ospedale S. Giuseppe - Milano	Intervento per tumore maligno del colon: mortalità a trenta giorni	2,96%	4,37%

Tumori del retto

Anche per i tumori del retto, uno degli indicatori considerati dal portale è la mortalità a trenta giorni dall'intervento di rimozione della neoplasia. La media nazionale per questo indicatore è 1,99%

Ecco per la Regione Lombardia la mappa dei semafori verdi per l'indicatore:

Ospedali a rilevanza nazionale:

Strutture	Indicatore	Valore indicatore	Media nazionale
Azienda Ospedaliera Spedali Civili - Brescia	Intervento per tumore maligno del retto: mortalità a trenta giorni	0,86%	1,99%
Ospedale di Circolo - Rho	Intervento per tumore maligno del retto: mortalità a trenta giorni	0,93%	1,99%
Ospedale Policlinico S. Matteo - Pavia	Intervento per tumore maligno del retto: mortalità a trenta giorni	0,96%	1,99%
Ospedale S. Gerardo -	Intervento per tumore maligno del retto:	1,01%	1,99%

Monza	mortalità a trenta giorni		
Istituto Europeo di Oncologia - Milano	Intervento per tumore maligno del retto: mortalità a trenta giorni	1,29%	1,99%
Istituto Clinico Humanitas - Rozzano	Intervento per tumore maligno del retto: mortalità a trenta giorni	1,52%	1,99%

Presidi ospedalieri: nessuno

Case di cura: nessuna

Tumore del Polmone

Per i tumori del polmone uno degli indicatori considerati dal portale è la mortalità a trenta giorni dall'intervento di rimozione della neoplasia. La media nazionale per questo indicatore è 1,54%.

Ecco per la Regione Lombardia la mappa dei semafori verdi per l'indicatore:

Ospedali a rilevanza nazionale:

Strutture	Indicatore	Valore indicatore	Media nazionale
Azienda Ospedaliera Spedali Civili - Brescia	Intervento per tumore maligno del polmone: mortalità a trenta giorni	0,42%	1,54%
Istituto di Ricerca S. Raffaele - Milano	Intervento per tumore maligno del polmone: mortalità a trenta giorni	0,57%	1,54%
Ospedale di Circolo A. Manzoni - Lecco	Intervento per tumore maligno del polmone: mortalità a trenta giorni	0,85%	1,54%

Ospedale S.Gerardo - Monza	Intervento per tumore maligno del polmone: mortalità a trenta giorni	0,91%	1,54%
Istituto Europeo di Oncologia - Milano	Intervento per tumore maligno del polmone: mortalità a trenta giorni	0,96%	1,54%
Ospedale Policlinico S. Matteo - Pavia	Intervento per tumore maligno del polmone: mortalità a trenta giorni	0,99%	1,54%

Presidi ospedalieri:

Strutture	Indicatore	Valore indicatore	Media nazionale
Ospedale Generale Valduce - Como	Intervento per tumore maligno del polmone: mortalità a trenta giorni	0,74%	1,54%

Case di cura: nessuna

Apparato respiratorio

Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva

Sul fronte dell'apparato respiratorio il portale "Dove e come mi curo" guarda la qualità della gestione della BPCO – Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, una malattia polmonare progressiva, non completamente reversibile. La BPCO ostruisce le vie aeree, rendendo difficoltosa la respirazione. Pazienti con BPCO, inclusi quelli con bronchite cronica ed enfisema, mostrano sintomi che vanno da tosse ed espettorato a mancanza di fiato durante sforzi anche modesti (anche camminare). Gli indicatori di performance considerati in questo caso sono la mortalità a trenta giorni dal ricovero per BPCO riacutizzata e riammissioni ospedaliere a trenta giorni per BPCO riacutizzata. La media nazionale per il primo indicatore è 8,79%. La media per il secondo è 13,58%.

Ecco per la Regione Lombardia la mappa dei semafori verdi contemporaneamente per entrambi gli indicatori:

Ospedali a rilevanza nazionale:

Strutture	Indicatore	Valore indicatore	Media nazionale
Ospedale Carlo Mira - Casorate Primo	BPCO riacutizzata: mortalità a trenta giorni dal ricovero	0,83%	8,79%
	BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a trenta giorni	5,4%	13,58%
INRCA - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Casatenovo	BPCO riacutizzata: mortalità a trenta giorni dal ricovero	1,11%	8,79%
	BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a trenta giorni	6,67%	13,58%
Ospedale di Cuasso al Monte - Cuasso al Monte	BPCO riacutizzata: mortalità a trenta giorni dal ricovero	1,13%	8,79%
	BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a trenta giorni	8,62%	13,58%
Ospedale Zappatoni - Cassano D'Adda	BPCO riacutizzata: mortalità a trenta giorni dal ricovero	1,17%	8,79%
	BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a trenta giorni	10,85%	13,58%
Ospedale SS.Trinita' - Romano di Lombardia	BPCO riacutizzata: mortalità a trenta giorni dal ricovero	2,62%	8,79%
	BPCO riacutizzata: riammissioni	8,53%	13,58%

	ospedaliere a trenta giorni		
Centro Medico Montescano	BPCO riacutizzata: mortalità a trenta giorni dal ricovero	2,66%	8,79%
	BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a trenta giorni	9,04%	13,58%
Ospedale CTO – Centro Traumatologico Ortopedico	BPCO riacutizzata: mortalità a trenta giorni dal ricovero	2,71%	8,79%
	BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a trenta giorni	7,72%	13,58%
Ospedale G. Casati Passirana - Rho	BPCO riacutizzata: mortalità a trenta giorni dal ricovero	3,22%	8,79%
	BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a trenta giorni	7,1%	13,58%
Ospedale Morelli - Sondalo	BPCO riacutizzata: mortalità a trenta giorni dal ricovero	4,55%	8,79%
	BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a trenta giorni	11,4%	13,58%
Ospedale S. Antonio Abate – Gallarate	BPCO riacutizzata: mortalità a trenta giorni dal ricovero	5,61%	8,79%
	BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a trenta giorni	9,92%	13,58%
Ospedale di Circolo – Abbiategrosso	BPCO riacutizzata: mortalità a trenta giorni dal ricovero	5,74%	8,79%
	BPCO riacutizzata: riammissioni	9,84%	13,58%

	ospedaliere a trenta giorni		
Ospedale di Desenzano - Desenzano del Garda	BPCO riacutizzata: mortalità a trenta giorni dal ricovero	6,27%	8,79%
	BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a trenta giorni	9,98%	13,58%
Ospedale Pesenti Fenaroli - Alzano Lombardo	BPCO riacutizzata: mortalità a trenta giorni dal ricovero	6,37%	8,79%
	BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a trenta giorni	9,42%	13,58%

Presidi ospedalieri: nessuno

Case di cura:

Strutture	Indicatore	Valore indicatore	Media nazionale
Casa di cura Domus Salutis - Brescia	BPCO riacutizzata: mortalità a trenta giorni dal ricovero	1,92%	8,79%
	BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a trenta giorni	8,75%	13,58%
Casa di cura Villa Gemma - Gardone Riviera	BPCO riacutizzata: mortalità a trenta giorni dal ricovero	2,38%	8,79%
	BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a trenta giorni	10,34%	13,58%
Casa di cura Palazzolo - Fondazione Don Gnocchi - Milano	BPCO riacutizzata: mortalità a trenta giorni dal ricovero	2,47%	8,79%
	BPCO riacutizzata: riammissioni	6,28%	13,58%

	ospedaliere a trenta giorni		
Casa di cura le Terrazze - Cunardo	BPCO riacutizzata: mortalità a trenta giorni dal ricovero	5,34%	8,79%
	BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a trenta giorni	3,93%	13,58%
Casa di cura Figlie di S.Camillo - Cremona	BPCO riacutizzata: mortalità a trenta giorni dal ricovero	6,5%	8,79%
	BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a trenta giorni	1,39%	13,58%

Area Cardio- e cerebrovascolare

Ictus

Per l'Ictus gli indicatori considerati sono la mortalità a trenta giorni dal ricovero e le riammissioni ospedaliere a trenta giorni dal primo ricovero. La media nazionale per questi due indicatori è 12,06% e 10,29% rispettivamente.

Ecco per la Regione Lombardia la mappa dei semafori verdi contemporaneamente per entrambi gli indicatori:

Ospedali a rilevanza nazionale: nessuno

Strutture	Indicatore	Valore indicatore	Media nazionale
Ospedale Luini Confalonieri - Luino	Ictus: mortalità a trenta giorni dal ricovero	4,19%	12,06%
	Ictus: riammissioni ospedaliere a trenta giorni	5,02%	10,29%

Istituto di Ricerca S. Raffaele - Milano	Ictus: mortalità a trenta giorni dal ricovero	7,11%	12,06%
	Ictus: riammissioni ospedaliere a trenta giorni	7,62%	10,29%
Ospedale Civile - Sondrio	Ictus: mortalità a trenta giorni dal ricovero	7,33%	12,06%
	Ictus: riammissioni ospedaliere a trenta giorni	6,95%	10,29%
Ospedale Maggiore Policlinico Milano	Ictus: mortalità a trenta giorni dal ricovero	8,26%	12,06%
	Ictus: riammissioni ospedaliere a trenta giorni	6,88%	10,29%
Azienda Ospedaliera Carlo Poma - Mantova	Ictus: mortalità a trenta giorni dal ricovero	8,79%	12,06%
	Ictus: riammissioni ospedaliere a trenta giorni	8,1%	10,29%
Ospedale di Circolo - Desio	Ictus: mortalità a trenta giorni dal ricovero	9,09%	12,06%
	Ictus: riammissioni ospedaliere a trenta giorni	5,93%	10,29%

Presidi ospedalieri:

Strutture	Indicatore	Valore indicatore	Media nazionale
Ospedale Generale Valduce – Como	Ictus: mortalità a trenta giorni dal ricovero	6,54%	12,06%
	Ictus: riammissioni ospedaliere a trenta giorni	8,19%	10,29%

Case di Cura: nessuna

Infarto

Gli indicatori considerati per valutare la qualità dell'assistenza nella gestione degli infarti sono: la mortalità a 30 giorni dal ricovero per questo evento (la media nazionale per questo indicatore è 9,98%); il volume complessivo di interventi di angioplastica coronarica effettuati (Volume di PTCA - Una recente analisi delle revisioni sistematiche presenti in letteratura ha identificato come soglia di volume per la PTCA 200/400 casi/anno, soglia al di sotto della quale l'efficacia dell'assistenza erogata potrebbe essere compromessa); la proporzione di pazienti trattati con PTCA entro 48 ore dal ricovero (la media nazionale per questo indicatore è 36,71%).

Ecco per la Regione Lombardia la mappa dei semafori verdi contemporaneamente per tutti i tre indicatori:

Ospedali a rilevanza nazionale:

Strutture	Indicatore	Valore indicatore	Media nazionale
Ospedale di Circolo A. Manzoni - Lecco	Angioplastica	495	200/400 casi/anno
	Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 48 ore	61,51%	36,71%
	Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	3,63%	9,98%
Centro Cardiologico Monzino - Milano	Angioplastica	1938	200/400 casi/anno
	Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 48 ore	59,18%	36,71%
	Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	5,16%	9,98%
IRCCS Policlinico S.	Angioplastica	696	200/400 casi/anno

Donato - San Donato Milanese	Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 48 ore	60,85%	36,71%
	Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	7,52%	9,98%
Ospedale di Circolo - Busto Arsizio	Angioplastica	515	200/400 casi/anno
	Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 48 ore	48,9%	36,71%
	Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	6,91%	9,98%
Ospedale di Circolo - Desio	Angioplastica	506	200/400 casi/anno
	Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 48 ore	63,72%	36,71%
	Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	7,49%	9,98%
Ospedale Niguarda - Ca'Granda - Milano	Angioplastica	634	200/400 casi/anno
	Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 48 ore	57,66%	36,71%
	Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	7%	9,98%

Presidi ospedalieri: nessuno

Case di Cura:

Strutture	Indicatore	Valore indicatore	Media nazionale
------------------	-------------------	--------------------------	------------------------

Istituto Clinico S. Ambrogio - Milano	Angioplastica	734	200/400 casi/anno
	Infarto Miocardico Acuto: proporzione di trattati con PTCA entro 48 ore	61,55%	36,71%
	Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni	4,53%	9,98%

Insufficienza cardiaca

L'insufficienza cardiaca (detta anche scompenso cardiaco) è quella condizione clinica che riduce la capacità del cuore di contrarsi e, quindi, di pompare nelle arterie la quantità di sangue adeguata alle necessità del corpo umano.

Uno degli indicatori che il portale utilizza per valutare le performance delle strutture sanitarie su questo fronte è la mortalità a trenta giorni dal ricovero, che consente di calcolare, tra tutti i pazienti ricoverati per insufficienza cardiaca, quanti muoiono durante i 30 giorni successivi al ricovero in ospedale. Più basso è il numero di pazienti morti durante i 30 giorni successivi al ricovero, più alta risulta la qualità delle cure offerte dall'ospedale in cui è avvenuto il ricovero. La media nazionale per questo indicatore è 10,67%.

Ecco per la Regione Lombardia la mappa dei semafori verdi per l'indicatore:

Ospedali a rilevanza nazionale:

Strutture	Indicatore	Valore indicatore	Media nazionale
Centro Cardiologico Monzino - Milano	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a trenta giorni dal ricovero	2,1%	10,67%
Fondazione Maugeri - Istituto Scientifico di Riabilitazione di Tradate	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a trenta giorni dal ricovero	2,32%	10,67%
Ospedale Morelli – Sondalo	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a trenta giorni dal ricovero	2,55%	10,67%
Ospedale Crotta Oltrocchi - Vaprio	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a trenta giorni dal ricovero	2,72%	10,67%

D'adda			
Azienda ospedaliera Spedali Civili di Brescia - Ospedale di Montichiari	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a trenta giorni dal ricovero	2,84%	10,67%
Centro Medico Montescano - Montescano	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a trenta giorni dal ricovero	3,37%	10,67%
Ospedale SS.Trinita' - Romano di Lombardia	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a trenta giorni dal ricovero	3,95%	10,67%
Ospedale Maggiore Policlinico	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a trenta giorni dal ricovero	4,25%	10,67%
Ospedale di Legnano - Cuggiono	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a trenta giorni dal ricovero	4,33%	10,67%
Azienda Ospedaliera Spedali Civili - Brescia	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a trenta giorni dal ricovero	4,45%	10,67%
Ospedale S.Gerardo - Monza	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a trenta giorni dal ricovero	4,75%	10,67%
Ospedale di Circolo A. Manzoni - Lecco	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a trenta giorni dal ricovero	4,79%	10,67%
Ospedale Carlo Borrella - Giussano	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a trenta giorni dal ricovero	4,79%	10,67%
Istituto di Ricerca S. Raffaele - Milano	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a trenta giorni dal ricovero	4,9%	10,67%
Ospedale Niguarda - Ca'Granda - Milano	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a trenta giorni dal ricovero	4,9%	10,67%
Ospedale S. Anna - Como	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a trenta giorni dal ricovero	5,24%	10,67%
Ospedale L. Sacco - Milano	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a trenta giorni dal ricovero	5,29%	10,67%
Ospedale Luini Confalonieri -	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a trenta giorni dal ricovero	5,36%	10,67%

Luino			
Ospedale Civile - Vimercate	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a trenta giorni dal ricovero	5,52%	10,67%
Ospedale Civico - Codogno	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a trenta giorni dal ricovero	5,77%	10,67%
Ospedale Maggiore - Lodi	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a trenta giorni dal ricovero	5,81%	10,67%
Azienda ospedaliera S. Paolo - Milano	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a trenta giorni dal ricovero	6,42%	10,67%
Ospedale di Circolo - Abbiategrasso	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a trenta giorni dal ricovero	6,62%	10,67%
Ospedale Bolognini - Seriate	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a trenta giorni dal ricovero	6,64%	10,67%
IRCCS Policlinico S. Donato - San Donato Milanese	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a trenta giorni dal ricovero	6,90%	10,67%
Istituto Clinico Humanitas - Rozzano	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a trenta giorni dal ricovero	6,96%	10,67%
Ospedale S.C. Borromeo - Milano	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a trenta giorni dal ricovero	7,32%	10,67%
Azienda Ospedaliera Carlo Poma - Mantova	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a trenta giorni dal ricovero	7,7%	10,67%
Ospedale di Treviglio e Caravaggio - Treviglio	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a trenta giorni dal ricovero	7,79%	10,67%
Ospedale Oglio Po-Casalmaggiore	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a trenta giorni dal ricovero	7,96%	10,67%

Presidi ospedalieri:

Strutture	Indicatore	Valore indicatore	Media nazionale
Ospedale San Pellegrino - Castiglione delle Stiviere	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a trenta giorni dal ricovero	2,19%	10,67%

Ospedale Moriggia Pelascini - Gravedona	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a trenta giorni dal ricovero	7,97 %	10,67%
---	--	--------	--------

Case di cura:

Strutture	Indicatore	Valore indicatore	Media nazionale
Casa di cura Figlie di S.Camillo - Cremona	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a trenta giorni dal ricovero	2,18%	10,67%
Casa di cura S. Clemente - Mantova	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a trenta giorni dal ricovero	4,79%	10,67%
Policlinico S. Pietro - Ponte San Pietro	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a trenta giorni dal ricovero	4,81%	10,67%
Istituto Clinici di Brescia - Brescia	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a trenta giorni dal ricovero	5,65%	10,67%
Casa di cura S. Anna - Brescia	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a trenta giorni dal ricovero	6,66%	10,67%
Istituto Clinico S. Ambrogio - Milano	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a trenta giorni dal ricovero	6,84%	10,67%

Ossa e articolazioni

Frattura femore

Per la frattura del femore gli indicatori considerati dal portale sono la mortalità a trenta giorni dal ricovero e la quota di interventi chirurgici eseguiti entro 48 ore dal ricovero. I valori medi nazionali per questi indicatori sono rispettivamente 6,02% e 40,16%.

Ecco per la Regione Lombardia la mappa dei semafori verdi contemporaneamente per entrambi gli indicatori:

Ospedali a rilevanza nazionale: nessuno

Strutture	Indicatore	Valore indicatore	Media nazionale
Ospedale CTO – Centro Traumatologico	Frattura del collo del femore: mortalità a trenta giorni dal ricovero	0,81%	6,02%
	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 48 ore	59,25%	40,16%
	Frattura del collo del femore: tempi di attesa per intervento chirurgico	3 giorni	4 giorni
Ospedale Galmarini - Tradate	Frattura del collo del femore: mortalità a trenta giorni dal ricovero	3,25%	6,02%
	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 48 ore	71,33%	40,16%
	Frattura del collo del femore: tempi di attesa per intervento chirurgico	3 giorni	4 giorni
Ospedale Bolognini - Seriate	Frattura del collo del femore: mortalità a trenta giorni dal ricovero	3,91%	6,02%
	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 48 ore	66,9%	40,16%
	Frattura del collo del femore: tempi di attesa per intervento chirurgico	3 giorni	4 giorni
Ospedale Riuniti - Bergamo	Frattura del collo del femore: mortalità a trenta giorni dal ricovero	4,01%	6,02%
	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 48 ore	63%	40,16%

	Frattura del collo del femore: tempi di attesa per intervento chirurgico	3 giorni	4 giorni
Ospedale di Circolo e Fondaz. Macchi - Varese	Frattura del collo del femore: mortalità a trenta giorni dal ricovero	4,07%	6,02%
	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 48 ore	86,54%	40,16%
	Frattura del collo del femore: tempi di attesa per intervento chirurgico	2 giorni	4 giorni

Presidi ospedalieri:

Strutture	Indicatore	Valore indicatore	Media nazionale
Ospedale Valcamonica Esine - Esine	Frattura del collo del femore: mortalità a trenta giorni dal ricovero	3,13%	6,02%
	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 48 ore	61,5%	40,16%
	Frattura del collo del femore: tempi di attesa per intervento chirurgico	3 giorni	4 giorni

Case di cura:

Strutture	Indicatore	Valore indicatore	Media nazionale
Casa di cura Poliambulanza - Brescia	Frattura del collo del femore: mortalità a trenta giorni dal ricovero	3,37%	6,02%

	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 48 ore	93,25%	40,16%
	Frattura del collo del femore: tempi di attesa per intervento chirurgico	2 giorni	4 giorni
Policlinico S. Marco - Osio Sotto	Frattura del collo del femore: mortalità a trenta giorni dal ricovero	3,87%	6,02%
	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 48 ore	66,89 %	40,16%
	Frattura del collo del femore: tempi di attesa per intervento chirurgico	3 giorni	4 giorni
Policlinico S. Pietro - Ponte San Pietro	Frattura del collo del femore: mortalità a trenta giorni dal ricovero	4,31%	6,02%
	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 48 ore	61,72%	40,16%
	Frattura del collo del femore: tempi di attesa per intervento chirurgico	3 giorni	4 giorni

Artroscopia di ginocchio

L'artroscopia è una tecnica chirurgica che permette di visualizzare, diagnosticare e trattare le patologie all'interno delle articolazioni attraverso un'incisione di pochi millimetri. Il chirurgo introduce attraverso una piccola incisione, uno strumento di circa 5mm di diametro (artroscopio), che permette di illuminare e visualizzare l'interno dell'articolazione. L'indicatore usato per misurare la performance in questo ambito dell'assistenza è la necessità di un secondo intervento a sei mesi dal primo. Tale indicatore consente di calcolare il numero di pazienti che devono subire un secondo intervento di artroscopia al ginocchio dopo 6 mesi dal primo, tra tutti i pazienti che si sottopongono a tale intervento ortopedico (reintervento entro sei mesi). Chiaramente più è basso il numero di pazienti che devono subire un secondo intervento di artroscopia al ginocchio dopo 6

mesi dal primo, più alta è la “buona riuscita” del primo intervento. La media nazionale per questo indicatore è 1,44%.

Ecco la mappa dei semafori verdi nella Regione Lombardia per questo indicatore:

Ospedali a rilevanza nazionale:

Strutture	Indicatore	Valore indicatore	Media nazionale
Azienda Ospedaliera Carlo Poma - Mantova	Intervento di artroscopia di ginocchio: reintervento entro 6 mesi	0,30%	1,44%
Istituto Clinico Humanitas - Rozzano	Intervento di artroscopia di ginocchio: reintervento entro 6 mesi	0,36%	1,44%
Ospedale di Circolo - Busto Arsizio	Intervento di artroscopia di ginocchio: reintervento entro 6 mesi	0,38%	1,44%
Ospedale di Treviglio e Caravaggio - Treviglio	Intervento di artroscopia di ginocchio: reintervento entro 6 mesi	0,51%	1,44%
Ospedale Civile di Iseo	Intervento di artroscopia di ginocchio: reintervento entro 6 mesi	0,6%	1,44%
Ospedale civile S.G.Bianco - San Giovanni	Intervento di artroscopia di ginocchio: reintervento entro 6 mesi	0,62%	1,44%
Ospedale Generale Provinciale - Saronno	Intervento di artroscopia di ginocchio: reintervento entro 6 mesi	0,62%	1,44%
IRCCS Policlinico S. Donato - San Donato Milanese	Intervento di artroscopia di ginocchio: reintervento entro 6 mesi	0,67%	1,44%

Ospedale Galmarini - Tradate	Intervento di artroscopia di ginocchio: reintervento entro 6 mesi	0,69%	1,44%
Istituto Ortopedico G. Pini – Milano	Intervento di artroscopia di ginocchio: reintervento entro 6 mesi	0,76%	1,44%
Istituto Multimedica Holding - Sesto San Giovanni	Intervento di artroscopia di ginocchio: reintervento entro 6 mesi	0,81%	1,44%
Ospedale CTO – Centro Traumatologico Ortopedico	Intervento di artroscopia di ginocchio: reintervento entro 6 mesi	0,88%	1,44%
Ospedale Bassini - Cinisello Balsamo	Intervento di artroscopia di ginocchio: reintervento entro 6 mesi	0,99%	1,44%

Presidi ospedalieri: nessuno

Case di cura:

Strutture	Indicatore	Valore indicatore	Media nazionale
Cliniche Gavazzeni - Bergamo	Intervento di artroscopia di ginocchio: reintervento entro 6 mesi	0,23%	1,44%
Ospedale Suzzara - Suzzara	Intervento di artroscopia di ginocchio: reintervento entro 6 mesi	0,31%	1,44%
Casa di cura Capitanio - Milano	Intervento di artroscopia di ginocchio: reintervento entro 6 mesi	0,41%	1,44%
Istituto Clinico S.Siro - Milano	Intervento di artroscopia di ginocchio: reintervento	0,55%	1,44%

	entro 6 mesi		
Istituto Villa Aprica - Como	Intervento di artroscopia di ginocchio: reintervento entro 6 mesi	0,59%	1,44%
Casa di cura San Carlo - Paderno Dugnano	Intervento di artroscopia di ginocchio: reintervento entro 6 mesi	0,66%	1,44%
Casa di cura Città di Pavia	Intervento di artroscopia di ginocchio: reintervento entro 6 mesi	0,86%	1,44%
Casa di cura Beato Matteo - Vigevano	Intervento di artroscopia di ginocchio: reintervento entro 6 mesi	0,91%	1,44%

Sintesi e riflessioni – La Lombardia, con 167 strutture considerate (51 case di cura, 8 presidi ospedalieri e 108 ospedali a rilevanza nazionale), è ampiamente promossa con semafori verdi nella gestione di tutte le aree malattia osservate. In particolar modo, il maggior numero di semafori verdi si riscontra per gli indicatori relativi alla gestione delle malattie cardio- e cerebrovascolari, per i tumori e le patologie di ossa e articolazioni.

La Regione presenta un numero di semafori verdi leggermente inferiore, invece, nella gestione delle malattie dell'apparato respiratorio e nella gestione del parto.

Si noti che le strutture considerate sono state selezionate tra tutte quelle presenti sul territorio regionale poiché sono quelle che trattano tutte o alcune patologie prese in esame dal portale "Doveecomemicuro.it".

UFFICIO STAMPA - comunicazione@doveecomemicuro.it

Nicola Cerbino Cell. 335 7125703 - Paola Mariano cell 320 4013549- Ester Trevisan cell. 3335620623

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Dr Ferruccio Pelone – ferruccio.pelone@rm.unicatt.it

Dr sa Maria Avolio – maria.avolio@rm.unicatt.it