

Tabella 1. Indicatori di appropriatezza prescrittiva e aderenza al trattamento nel trattamento

INDICATORE	VALORE ATTUALE	VERSO DEL MIGLIORAMENTO
INDICATORE 1. Percentuale di pazienti affetti da artrite reumatoide con fallimento al MTX, contro-indicazione al MTX o in trattamento prolungato con corticosteroidi, non avviati al trattamento con farmaci biologici	9%	Riduzione
INDICATORE 2. Percentuale di pazienti affetti da artrite reumatoide avviati al trattamento con farmaci biologici senza pregresso utilizzo di DMARDs classici per almeno 3 mesi	42%	Riduzione
INDICATORE 3. Percentuale di pazienti affetti da artrite reumatoide avviati al trattamento con un TNF alfa inibitore	49%	Crescita
INDICATORE 4. Percentuale di pazienti affetti da artrite reumatoide avviati al trattamento con un TNF alfa inibitore a brevetto scaduto	90%	Crescita
INDICATORE 5. Percentuale di pazienti affetti da artrite reumatoide avviati al trattamento con un TNF alfa inibitore a brevetto scaduto nella formulazione a minor costo	98%	Crescita

Figura 1. Prospettive per l'equilibrio tra appropriatezza prescrittiva e sostenibilità economica nell'uso dei farmaci: le aree di sotto- e sovra-utilizzo e la relazione tra miglioramento dell'appropriatezza e variazione della spesa farmaceutica

